

16.10.2023/Kiel/Norwich/Würzburg. **Mikroalgen, einer der Grundbausteine des Lebens im Meer, kompensieren Nährstoffmangel mithilfe einer lichtgetriebenen Protonenpumpe, womit sie sich auch an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Diesen Mechanismus haben Forschende des GEOMAR Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung Kiel und des Fachbereichs für Umweltwissenschaften an der Universität von East Anglia (UEA) entdeckt. Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen sie heute in der Zeitschrift Nature Microbiology. Die Entdeckung öffnet den Weg für biotechnologische Entwicklungen, die den negativen Auswirkungen veränderter Umweltbedingungen wie der Erwärmung der Ozeane und sogar der sinkenden Produktivität von Nutzpflanzen entgegenwirken könnten.**

Gemeinsame Pressemeldung der Universität Würzburg und des GEOMAR Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung Kiel. Die Studie zeigt, wie Mikroalgen durch eine lichtgetriebene Protonenpumpe Nährstoffmangel kompensieren und so den negativen Auswirkungen des Klimawandels entgegenwirken. Die Studie erscheint heute in der Zeitschrift Nature Microbiology.

Erstautoren sind Thomas Mock, Professor für Marine Mikrobiologie an der UEA, und sein ehemaliger Doktorand Jan Strauss, der die Arbeit nach seiner Promotion als Postdoktorand am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Hamburg und im Labor von Professor Dr. Alexandra Z. Worden, Gründerin der Forschungseinheit Ökosystembiologie des Ozeans am GEOMAR und Fellow des Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön, weitergeführt hat. An der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) waren Professor Dr. Georg Nagel und Dr. Shiqiang Gao aus der Abteilung für Neurophysiologie des Physiologischen Instituts daran beteiligt.

Das Team untersuchte das so genannte eukaryotische Phytoplankton, pflanzliche Organismen, die auch als Mikroalgen bezeichnet werden und die in weiten Teilen des Ozeans vorkommen.

Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass die Algen einen Mechanismus entwickelt haben, um mit dem zu erwartenden Nährstoffmangel aufgrund steigender Wassertemperaturen umzugehen. Das sind gute Nachrichten für die Nahrungskette – denn marine Mikroalgen bilden die Basis des größten Nahrungsnetzes der Erde, zu dem auch Krill, Fische, Pinguine und Wale gehören – und sie entziehen der Atmosphäre Kohlendioxid (CO₂) und produzieren Sauerstoff.

„Damit Algen Nahrung produzieren und CO₂ aus der Atmosphäre entfernen können, brauchen sie Sonnenlicht“, erklärt Professor Dr. Thomas Mock. Außerdem benötige die zelluläre Maschinerie viel Eisen, um das Sonnenlicht nutzen zu können. Auf 35 Prozent der Meeresoberfläche sei jedoch nicht genug Eisen vorhanden, um das Wachstum der Algen zu unterstützen. „In diesen Gebieten wird die Produktivität der Algen wahrscheinlich viel geringer sein, ähnlich wie bei Landpflanzen, denen es an eisen- und stickstoffhaltigem Dünger mangelt und die deshalb nicht so gut wachsen.“

Der Klimawandel wird diesen Effekt voraussichtlich noch verstärken: „Je wärmer das Oberflächenwasser wird, desto weniger Nährstoffe sind in diesen Oberflächenwasserschichten vorhanden, weil die Durchmischung abnimmt, die normalerweise Nährstoffe aus dem tieferen Meer zuführt.“ In der Folge müssten die Algen hungern, produzierten weniger Nahrung und nähmen weniger CO₂ aus der Atmosphäre auf.

Das Forscherteam fand nun heraus, dass die Algen einen Weg gefunden haben, mit dem Nährstoffmangel umzugehen, indem sie eine zusätzliche Zellmaschinerie entwickelt haben, die es ihnen ermöglicht, Sonnenlicht für ihr Wachstum zu nutzen, ohne dafür Eisen zu benötigen. Jan Strauss erklärt: „Einige Gruppen von Mikroalgen können die Photosynthese umgehen, indem sie eine lichtgetriebene Protonenpumpe als Wachstumsmotor verwenden.“

Statt auf Proteine der photosynthetischen Zellmaschinerie angewiesen zu sein, die Eisen benötigen, verwenden die Algen ein lichtgetriebenes Membranprotein namens Rhodopsin, das mit einem Protein im menschlichen Auge verwandt ist. Diese Proteine benötigen kein Eisen, und eine bestimmte Gruppe von ihnen pumpt Protonen durch die Membranen und ermöglicht so die Synthese von ATP (Adenosintriphosphat), dem universellen Energieträger aller Zellen – eine der Hauptfunktionen der Photosynthese in allen photosynthetischen Organismen.

Während der gemeinsamen Arbeit im Labor von Georg Nagel gelang es

Publikation:

Strauss, Jan et al. Plastid-localized xanthorhodopsin increases diatom biomass and ecosystem productivity in iron-limited surface ocean. Nature Microbiology.

DOI: 10.1038/s41564-023-01498-5

<https://doi.org/10.1038/s41564-023-01498-5>

Projekt-Förderung:

Die Doktorandenstelle von Jan Strauss wurde von der School of Environmental Sciences der UEA finanziert. Er erhielt außerdem ein Stipendium des EMBL Interdisciplinary Postdoc (EIPOD) Programms im Rahmen des Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND Programms (Grant Nummer 664726). Weitere Mittel wurden durch das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und der Gordon and Betty Moore Foundation (Grant 3788 an Alexandra Z. Worden) sowie durch Zuschüsse des Natural Environment Research Council bereitgestellt.

Links:

<https://www.geomar.de/fb3-ueb> Forschungseinheit Ökosystembiologie des Ozeans

Bildmaterial:

Unter www.geomar.de/n9154 steht Bildmaterial zum Download bereit.

Kontakt:

Ilka Thomsen (GEOMAR, Kommunikation & Medien), Tel.: 0431 600-2802, media@geomar.de